

---

# PESTE PORCINE AFRICAINE

## MESURES DE BIOSÉCURITÉ OBLIGATOIRES

---

### Mesures de biosécurité à appliquer immédiatement dans vos élevages

---

Interdiction stricte de laisser entrer dans votre exploitation toute personne ou véhicule extérieurs à l'élevage sauf autorisation de votre part et dans le respect des mesures d'hygiène.  
*NB : il est impératif de tenir un registre des entrées/ sorties des personnes et de notifier tout mouvement de porcin.*

---

Disposer d'un sas sanitaire à l'entrée de tous vos bâtiments d'élevage permettant un changement complet de tenue et un lavage des mains.

---

Tout intervenant extérieur devra disposer d'une tenue à usage unique et de bottes nettoyées et désinfectées.  
*NB : les personnes susceptibles d'avoir été en contact direct ou indirect avec des sangliers ou des exploitations atteintes de peste porcine africaine ne doivent pas être admises dans votre exploitation dans les 48 h suivant le contact à risque.*

---

Interdiction stricte de donner des déchets de cuisine aux porcs de votre élevage.

---

Le matériel (dont la semence) est livré dans la partie externe du sas et non à l'intérieur des bâtiments.

---

Si du matériel est utilisé en commun à plusieurs sites d'élevage, il est nettoyé et désinfecté avant chaque changement d'exploitation.

---

Faire en sorte d'empêcher tout contact entre les porcs et les sangliers notamment par des systèmes de clôtures étanches ou des courettes > 1,5 m.

---

Placer vos bacs d'équarrissage à l'extrémité de l'exploitation en bord de route.

---

Appliquer avec rigueur des mesures de dératisation et de nettoyage/désinfection de vos bâtiments entre deux bandes.

---

Les litières/paille sont entreposées à l'abri des sangliers et à distance de la zone de stockage des cadavres.

---

Le quai et l'aire de stockage pour l'embarquement des porcs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque départ d'animaux.

---